

# Kreuzotter

giftig, tagaktiv!

< 90cm

Zickzack-Muster auf Oberseite (auch rein schwarze Sonderform)  
= stärkerer Farbkontrast: grau / hellgrau

Farbe variiert: braun, grün, schwarz

Pupillen haben senkrechte Schlitz  
(Viperen-typisch)



Gift: lähmend über Giftzähne

↳ nicht gefährlich f. Mensch  
max. allergische Reaktion  
↳ sehr stark, aber geringe Menge

Wo:

Feuchte Wälder, Waldbränder, Moore  
eher in Norddeutschland

Im Süden auch Freigelande  
Bergwiesen, Geölfl bis 3000m üNN

Nahrung

↳ Lauerjäger: Biss → Verfolgung  
Mäuse, Eidechsen, Frösche

Gefahr für den Menschen

nur für Kinder & Alte

↳ rund um Bissstelle (1h später) große Schwellung  
↳ Nervengift → Lähmung, Atemnot, Herzstillstand  
↳ meist keine Symptome (zu schwach)

Feinde

Wildschwein! Greifvögel!

Uhu, Reiher, Krähe, Storch

Iltis, Marder, Fuchs, Katze

Ringelnatter, Viperfresser (auch umgekehrt)

Paarung

- Kollisionskampf der ♂ zuvor
- langes Vorspiel
- nach Winterstarre & Frühjahrsläutung  
April / Mai
- ovipar → brütet im Mutterleib  
5-15 Jung im August-Oktober