


ZECKEN

- zählt zu den Spinnentieren
 - 8 Beine (Spinnentier)
 - blutsaugend an Wirbeltieren
 - 900 Zeckenarten weltweit (20 Arten in Deutschland)
 - auffallende Mundwerkzeuge mit Stechtrüttel
 - Kann nach ausgiebiger Blutmealzeit bis 3cm groß werden
- gemeiner Holzbock => befällt am häufigsten den Menschen
braune Hundszecke
Igelzecke, Schafzecke
Auwaldzecke

2 Strategien der Wirtsfindung

LÄUFER: klettern auf Pflanze, halten sich mit Hinterbeinen fest und warten bis ein potentieller Wirt sie berührt, mit dem vorderen Beinpaaar klammern sie sich dann fest z.B. gem. Holzbock



JÄGER: bewegen sich aktiv vorwärts (5-8 m pro Std.)
z.B. braune Hundszecke

♂ MÄNNCHEN: saugen nur wenige Tage

♀ WEIBCHEN: saugen, wenn ungestört, über einige Wochen
benötigen Blut nicht nur zur eigenen Ernährung, sondern auch zur Eibildung

ZECKEN ALS KRANKHEITSÜBERTRÄGER

übertragen werden kann:

- * BORRELIOSIS
- * FSME

* BORRELIOSIS = Lyme-Krankheit

betrifft Haut, Nervensystem und Gelenke => verursacht durch Bakterien (*Borrelia burgdorferi*)
Ansteckungsgefahr groß zwischen März und Oktober
↳ BEHANDLUNG mit Antibiotika
auch mit Homöopathie mögliche Gaben

* BORRELIOSIS = Lyme-Krankheit

betrifft Haut, Nervensystem und Gelenke \Rightarrow verursacht durch Bakterien (*Borrelia burgdorferi*)

Ansteckungsgefahr groß zwischen März und Oktober

\hookrightarrow BEHANDLUNG mit Antibiotika

auch mit Homöopathie mögliche Gaben

etwa jede zwanzigste bis dritte Zecke in Deutschland ist mit Borrelien befallen (nicht jeder Stich führt zur Ansteckung)

\hookrightarrow wird die Zecke frühzeitig entfernt ist das Infektionsrisiko geringer

\hookrightarrow nur jeder dritte bis vierte Infizierte entwickelt Beschwerden

\Rightarrow keine Übertragung von Mensch zu Mensch!

\Rightarrow typ. Zeichen der Erkrankung:

- Wundröté
- Fieber

- Muskel- und Kopfschmerzen
- brennende Nervenschmerzen

- Taubheitsgefühl
- Sehstörungen / Hörstörungen

◦ bei Kindern häufig nicht eitrige Gehirnhautentzündung \Rightarrow Gesichtslähmungen

* FSME = Früh Sommer - Meningoenzephalitis

vorwiegend in Süddeutschland vorkommend

Infektion auch durch virusbelastete Milchprodukte möglich

\hookrightarrow aktive Impfung als vorbeugende Maßnahme möglich

\Rightarrow keine Übertragung von Mensch zu Mensch!

Übertragung v.a. durch gemeinen Holzbock und Auwaldzecke

\Rightarrow verursacht durch Viren

\hookrightarrow Keine ursächliche Behandlung möglich
 \Rightarrow Ruhe, Schmerzmittel

\Rightarrow typ. Zeichen der Erkrankung:

- grippeähnliche Symptome
- Fieber

- Gehirnhautentzündung
- typ. Zeichen: Nackensteifigkeit

!!! SUCH DICH NACH AUFENTHALT IN DER NATUR GRÜNDLICH NACH ZECKEN AB!!!

besonders Kniekehle, Leiste, Achseln,
hinter den Ohren, Kopf u. Haarsatz

!!! TRAG WENN MÖGLICH IM WALD UND WIESE GESCHLOSSENE SCHUHE UND LANGE HOSE.
ZIEH DIE STRÜMPFE ÜBER DIE HOSENBEINE!!!

!!! ENTFERNE DIE ZECKE SCHNELLSTMÖGLICH, WENN DU EINE FINDEST !!!

\hookrightarrow nahe an der Haut und schnell rausziehen. Am besten mit einer Pinzette.